

Clindaviv

Clindamicina 1%

DCI: Clindamicina

COMPOSICIÓN:

Cada 100g contiene:

Fosfato de clindamicina equivalente a1g

Clindamicina base

Excipientes c.s.p.....100g

Cada 100mL contiene:

Fosfato de clindamicina equivalente a.....1g

Clindamicina base

Excipientes c.s.p.....100mL

FORMA FARMACÉUTICA: Gel, Solución

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópico

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

La clindamicina se une a las subunidades 50S de los ribosomas bacterianos, inhibiendo la síntesis de proteínas. Dependiendo de su concentración en el lugar de su actuación y de la susceptibilidad del microorganismo, la clindamicina es bacteriostática o bactericida. La clindamicina se administra por vía oral, parenteral, tópica o vaginal. Después de su administración oral, se absorbe rápidamente el 90%. La velocidad de absorción es reducida por la presencia de alimento, pero no su extensión.

INDICACIONES:

Clindaviv está indicado para el tratamiento tópico del acné vulgar de grado II y III, caracterizado por lesiones inflamatorias tales como pústulas y pápulas.

POSOLÓGIA:

Gel: Lavar y secar la piel. Aplicar una delgada capa de Clindaviv sobre el área afectada dos veces al día o como lo indique el médico. El tratamiento puede durar de seis a ocho semanas antes de que se observe un efecto terapéutico. Si no observa una mejoría después de 6 a 8 semanas o si la afección empeora, se debe discontinuar el tratamiento. El médico prescriptor debe evaluar el beneficio de continuar el tratamiento mas allá de las 12 semanas de uso ininterrumpido, teniendo en cuenta el aumento del riesgo de resistencia a los fármacos antimicrobianos.

SOLUCIÓN:

Lavar y secar la piel. Aplicar Clindaviv sobre el área afectada dos veces al día o como lo indique el médico. El tratamiento puede durar de seis a ocho semanas antes de que se observe un efecto terapéutico. Si no observa una mejoría después de 6 a 8 semanas o si la afección empeora, se debe discontinuar el tratamiento. El médico prescriptor debe evaluar el beneficio de continuar el tratamiento más allá de las 12 semanas de uso ininterrumpido, teniendo en cuenta el aumento del riesgo de resistencia a los fármacos antimicrobianos.

CONTRAINDICACIONES:

Clindaviv no deberá ser usado en pacientes con sensibilidad conocida a la clindamicina o lincomicina o a cualquier componente de la formulación. Antecedentes conocidos de colitis a

antibióticos, colitis ulcerosa (incluida colitis pseudomembranosa) o enteritis regional.

REACCIONES ADVERSAS:

Se han reportados casos en sitio de aplicación, que incluyen ardar, prurito, sequedad, eritema, dolor y erupción. También se han reportado caso de dolor abdominal, irritación de la piel, trastornos gastrointestinales y dermatitis por contacto. Pueden desarrollarse rash maculopapular, eritema y prurito durante la utilización sistémica o tópica de clindamicina. La xerosis es efecto más frecuente de la aplicación tópica, pero puede ser atribuido al disolvente utilizado en la preparación. El alcohol, presente en algunas formulaciones tópicas puede irritar los ojos, membranas mucosas o piel erosionada si se le permite entrar en contacto con ellos.

INTERACCIONES:

Se ha demostrado que la clindamicina y la eritromicina son antagonistas in vitro. La clindamicina sistémica tiene propiedades de bloqueo neuromuscular que pueden potenciar la acción de otros agentes de bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, la clindamicina debe usarse con precaución en pacientes que reciben estos agentes. Combinaciones que contiene alguno de los siguientes activos, pueden interaccionar con la medicación: Jabones o limpiadores medicinales o abrasivos. Preparaciones para el acné que contienen agentes removedores de piel, tales como: Resorcinol y Acido Salicílico. Preparaciones tópicas que contienen alcohol, tales como: lociones para después de afeitar, astringentes, toallas húmedas perfumadas, crema de afeitar o lociones y jabones cosméticos de fuerte efecto secante.

PRECAUCIONES:

La clindamicina tópica debe usarse con precaución en pacientes atópicos, ya que puede causar dermatitis de contacto.

EMBARAZADO: La clindamicina tópica solamente debe usarse durante el embarazo si los beneficios previstos justifican el riesgo potencial para el feto.

LACTANCIA: La clindamicina tópica solamente debe usarse durante el periodo de lactancia si los beneficios previstos justifican el riesgo potencial para el lactante. Si se utiliza la clindamicina no debe aplicarse en el área de las mamas para evitar la ingesta accidental por parte del lactante. Pediatra: No se han llevado a cabo estudios apropiados que relacionen la edad con los efectos de la clindamicina tópica en niños hasta 12 años de edad. La seguridad y eficacia de la dosificación no han sido establecidas.

GERIATRÍA: No existe información disponible que relacione los efectos de clindamicina tópica en pacientes geriátricos.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INTOXICACIONES:

En caso de contacto accidental con los ojos u otras mucosas sensibles, lavar con abundante agua fresca. Si es ingerido accidentalmente y la cantidad es grande, deberá considerarse la posibilidad de realizar un lavado gástrico. Si se presenta una reacción de hipersensibilidad, deberá suspenderse la aplicación del producto y tratarla con los medicamentos adecuados.

CONSERVACIÓN: Conserva a temperatura no mayor a los 30°C

PRESENTACIÓN:

Gel: Caja conteniendo un tubo con 30g.

Solución: Caja conteniendo un frasco con 30mL.