Clotrifar

Clotrimazol 1%

DCI: Clotrimazol

COMPOSICIÓN:
Cada 100g contiene:
Clotrimazol 1%
Excipientes, c.s.p. .....100 g

FORMA FARMACÉUTICA: Crema
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Intravaginal

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:
Propiedades farmacodinamias: El clotrimazol actúa alterando la membrana de los hongos sensibles. El clotrimazol inhibe la síntesis del ergosterol al interaccionar con la 14-alfa-metilasa, una enzima del citocromo P450 que es necesaria para transformar el lanosterol a ergosterol, un componente esencial de la membrana. Este fármaco es eficaz frente a una amplia gama de microorganismos entrelos que se incluyen los Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cephalosporium, Cryptococcus, Epidermophyton floccosum, Microsporum canis, Malassezia furfur, Sporothrix, Trichophyton rubrum, y T. mentagrophytes. Algunas bacterias también son sensibles al clotrimazol, si bien este fármaco no se ha utilizado nunca clínicamente en el tratamiento de infecciones bacterianas. Los Trichomonas vaginalis no son sensibles a las concentraciones que se obtienen en la clínica Propiedades farmacocinéticas: Por vía vaginal, se absorbe entre el 5 y 10% de la dosis, pero las concentraciones plasmáticas son muy pequeñas. Debido a que el clotrimazol se fija a las mucosas oral y vaginal, se detectan concentraciones significativas del fármaco hasta 3 días después de su aplicación. Las pequeñas cantidades que se absorben son metabolizadas en el hígado y excretadas en la bilis

INDICACIONES: es un antimicótico de amplio espectro para infecciones vulvovaginales por hongos y levaduras (especialmente Candida albicans), Candida glabrata, Trichomonas vaginalis, colpitis por levaduras y/o trichomonas, así como para aliviar la comezón, ardor o irritación de genitales externos (vulva) asociados con infección vaginal.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
El tratamiento con Clotrimazol crema es por tres días, aplicando en forma diaria el contenido de un aplicador lleno (aproximadamente 5 g).

INTRUCCIONES PARA EL USO EN CREMA:
Este envase contiene aplicadores de plástico desechables. Los aplicadores están diseñados para la administración apropiada de la crema en la vagina.

- Remueva la tapa del tubo de crema y enrosque el aplicador de plástico al tubo.
- Exprima el tubo suavemente desde el extremo inferior y fuerce el medicamento al aplicador. El aplicador estará lleno cuando el embolo llega a su máxima longitud.

- Desenrosque el aplicador del tubo y vuelva a poner la tapa.
- Acuéstese de espalda y agarrando firmemente el aplicador, introdúzcalo en la vagina tanto como sea posible sin causar molestias.
- Empuje lentamente el embolo hasta que se detenga.
- Saque el aplicador cuidadosamente de la vagina y descártelo.
- Permanezca acostada durante 20 minutos después de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en aquellos pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula del producto.
REACIONES ADVERSAS: La aplicación vaginal del clotrimazol puede ocasionar irritación, quemazón, poliuria y dispareunia. Además, puede ocasionar a la pareja efectos irritantes locales durante o después de relaciones sexuales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO: Tanto los preparados tópicos de clotrimazol como los vaginales se clasifican dentro de la categoría B de riesgo en embarazo. La administración vaginal durante los trimestres 2 y 3 no ha producido en ningún caso ningún efecto adverso. Sin embargo, no se recomienda su uso durante el primer trimestre. No se han observado efectos teratogénicos en los animales de laboratorio, pero no se han llevado a cabo estudios controlados en el hombre. Se desconocen los efectos del clotrimazol durante la lactancia y no se debe aplicar este fármaco a los pechos durante la misma.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS: no se recomienda la administración simultánea de clotrimazol y nistatina. Puede reducir la efectividad y seguridad de los productos de látex (condones y diafragmas); sin embargo, el efecto es temporal y se presenta sólo durante el tratamiento.

SOBREDOSIFICACIÓN: El riesgo de intoxicación aguda o sobredosis es poco probable que ocurra después de una sola aplicación
vaginal (aplicación sobre una gran superficie en condiciones favorables para la absorción) o la ingestión oral inadvertida. No existe un antídoto específico. Una ingestión accidental puede provocar molestias gastrointestinales y/o vómitos.

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura no mayor a los 30ºC

PRESENTACIONES:
Caja conteniendo un tubo de 20g con tres aplicadores de Clotrifar 1%

Fabricado por:
González & Vicente
Laboratorio, GV. LAB., SRL
Sto. Dgo., República Dominicana
www.gvlaboratorio.com