


Hidrocortisona



HIDROCORTISONA 1% Y 2%

COMPOSICION:

Cada gramo de HIDROCORTISONA GV loción contiene:

Hidrocortisona base	1 g.
Excipiente c.s.p	100mL

Cada gramo de HIDROCORTISONA GV loción contiene:

Hidrocortisona base	2 g.
Excipiente c.s.p	100mL

FORMA FARMACEUTICA: Loción

VIAS DE ADMINISTRACION: Cutánea. Tópica

INDICACIONES:

HIDROCORTISONA GV está indicada para el tratamiento de las manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis y afecciones cutáneas que responden a la corticoterapia tópica: dermatitis por contacto, dermatitis atópica, seborreica e infantil; picaduras de insectos; dermatosis inflamatorias; eccema de los pies y manos; eccema numular; neurodermatitis localizada; liquen plano; dermatitis por estasis; lupus eritematoso discoide; prurito ano genital; xerosis; soriasis; otitis externa alérgica; erupción solar polimorfa y quemaduras menores.

POSOLÓGIA:t

Medicamento de aplicación tópica. Lavar con agua y jabón no agresivo, secar convenientemente el área a tratar. Aplique una ligera capa de la loción de una a cuatro veces por día en adultos y niños mayores de 12 años y de una a dos veces en niños menores de 12 años. La utilización de la loción siempre será bajo supervisión médica.

Después de la aplicación se deben lavar las manos para evitar contacto accidental con los ojos u otras mucosas.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la hidrocortisona, o los excipientes de la formulas. Contraindicado en casos de acné y rosácea; infecciones visibles en la piel de origen bacteriano, viral como la varicela y el herpes o provocados por hongos y parásitos, aun cuando incluyan una respuesta inflamatoria. Piel infectada, heridas, pie de atleta, úlceras de encamados, escoceduras o irritaciones de los pañales, mucosas (anal, genital, bucal).

REACCIONES ADVERSAS:

La incidencia de reacciones adversas por administración tópica es muy baja y se relacionan directamente con la concentración, volumen aplicado, extensión del área,

duración del tratamiento y el uso de oclusión, siendo el uso prolongado de este último, el factor principal de reacciones adversas.

Cuando se llegan a presentar reacciones adversas, son principalmente locales y pueden comprender dermatitis por contacto, atrofia cutánea, dermatitis acneiforme, rosácea, dermatitis perioral, estrías, telangiectasias, púrpura, foliculitis infecciosa, hipopigmentación y crecimiento excesivo de hongos y bacterias. En caso de presentarse por uso crónico o abuso serían: supresión reversible del eje hipotalámico-hipofisiario-suprarrenal, manifestaciones del síndrome de Cushing e hiperglucemia. El tratamiento consiste en recuperación de la función normal suprarrenal y pituitaria, mediante el retiro gradual de los corticosteroides.

INTERACCIONES:

No hay interacciones conocidas de hidrocortisona tópica y otros fármacos; sin embargo, si se desarrolla irritación, la aplicación tópica debe suspenderse para instituir la terapia apropiada. En presencia de infecciones cutáneas está indicado el uso de un fungicida, un antiviral o un antibacteriano; si la respuesta favorable no se presenta rápidamente, los corticosteroides deben ser suspendidos hasta que la infección haya sido adecuadamente controlada. No aplicar hidrocortisona en el mismo sitio que otras preparaciones dérmicas sin la prescripción médica.

PRECAUCIONES:

HIDROCORTISONA GV está indicada exclusivamente para uso externo, debiendo evitarse el contacto con la mucosa ocular, nasal y bucal. Si se aplica en exceso, no se obtendrán resultados más rápidos ni mejores. Sólo se intensificarán los efectos no deseados. ...

Aun cuando es un esteroide de baja potencia, es recomendable limitar su administración a periodos cortos de tratamiento, y en caso de uso crónico, vigilar los indicadores de efectos indeseables sistémicos. Se debe evitar la administración de corticosteroides tópicos en los párpados, cuando el paciente esté recibiendo esteroides oftálmicos debido a que se ha observado el desarrollo temprano de glaucoma. En pacientes pediátricos, especialmente cuando se tratan zonas extensas o se utilicen vendajes oclusivos (un pañal ajustado puede considerarse como tal), la absorción puede ser mayor, por lo que es importante vigilarlos estrechamente, para evitar reacciones secundarias, así como alteraciones en el crecimiento y maduración ósea.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

Dosis altas de HIDROCORTISONA pueden provocar hipertensión arterial, retención de agua y sales e incremento en la excreción de potasio y calcio.

El manejo debe incluir restricción de sal en la dieta y suplementación de potasio.

En caso de ingestión accidental, deben realizarse lavado gástrico y medidas generales de apoyo.

CONSERVACION:

Consérvese a temperatura ambiente.

PRESENTACION:

Caja conteniendo frasco colapsible semirrígido con 100 mL de Hidrocortisona 1%

Caja conteniendo frasco colapsible semirrígido con 100 mL de Hidrocortisona 2%

Fabricado por:
González & Vicente
Laboratorio, GV. LAB., SRL
Sto. Dgo., República Dominicana
gvlaboratorio.com

