

Retinoico



Acido Retinoico

0.05%

DCI: Ácido retinoico

COMPOSICIÓN:

Cada 100 gramo de crema contiene:

Ácido retinoico.....	0.05 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

Cada 100 gramo de gel contiene:

Ácido retinoico.....	0.05 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

FORMA FARMACÉUTICA: Crema, Gel

VIAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópico

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

Propiedades: Propiedades farmacodinamias: Los retinoides son mediadores intracrinós y paracrinós de la diferenciación y la proliferación celular, la apoptosis (muerte celular programada) y la reproducción. Las células regulan la formación de isómeros retinoides específicos dependiendo de la acción celular necesaria. Los numerosos efectos de retinoides reflejan la compleja biología de los receptores nucleares que median la actividad retinoide. Los receptores de los retinoides se dividen en los receptores X retinoides (RXRs) y los receptores del ácido retinoico (RARs); ambos tipos pueden ser divididos en 3 subtipos: alfa, beta y gamma. Estos subtipos de receptores se dividen en muchas isoformas. Propiedades farmacocinéticas: Se estudió la absorción percutánea del ácido retinoico al 1.0% p/p marcado con C14 en seis voluntarios masculinos adultos. Aproximadamente 80% del ácido retinoico aplicada se mantiene en la superficie de la piel, el ácido retinoico se detectó en cantidades mínimas en el estrato córneo y en las glándulas sebáceas de piel normal dos y cuatro horas después de la aplicación de ácido retinoico radiactivamente marcada. Apparently, el ácido retinoico forma productos de oxidación inactivos que se excretan en la orina y glucurónidos que se excretan en las heces.

INDICACIONES: Se utilizan en el tratamiento del fotoenvejecimiento, para tratar el acné y la piel fotodañada y para controlar los trastornos de queratinización como la ictiosis y la queratosis folicular.

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Crema: se recomienda aplicar en 2 - 3 aplicaciones diarias. La cantidad de crema estará en función del área a tratar, dando un suave masaje a fin de favorecer la absorción.

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en aquellos pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula del producto.

REACCIONES ADVERSAS: Hiperpigmentación o hipopigmentación reversibles, que pueden persistir varios meses tras la suspensión del tratamiento. Ampollas, costras, escozor, enrojecimiento severo, hinchazón de la piel. Todos estos efectos requieren atención médica. También puede aparecer sensación de calor, prurito leve y enrojecimiento, también leve, de la piel; puede producirse descamación a los pocos días de uso.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO: Debe evitarse la aplicación del fármaco en pacientes con eccema, ya que puede aparecer una irritación severa. El ácido retinoico sensibiliza la piel a los efectos de los rayos ultravioleta, por lo tanto, debe evitarse la exposición al sol. Más aún, los pacientes con quemaduras solares no deben aplicar el fármaco y deben esperar a que se recupere la piel.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS: Medicamentos fotosensibilizantes; cosméticos con acción desecante fuerte; preparaciones antiacnéicas que contengan azufre, debe evitarse o valorarse cuidadosamente el uso concomitante con queratolíticos, especialmente sulfuros, resorcinol, peróxido de benzoilo o ácido salicílico, así como jabones abrasivos, secantes o cosméticos medicados.

EMBARAZO Y LACTANCIA: Se desconoce si el ácido retinoico se excreta a través de la leche materna, por lo tanto, pacientes en etapa de lactancia deberán recibir el tratamiento suspendiendo la lactancia o posponiendo la terapéutica para continuar con aquélla. El ácido retinoico no afecta la fertilidad en animales, pero aumenta la reabsorción fetal, la incidencia de abortos espontáneos y anomalías fetales en el sistema nervioso central, oídos externos, timo, ojos, sistema musculoesquelético y en los grandes vasos sanguíneos.

SOBREDOSIFICACIÓN: No se conocen casos de sobredosis. Los síntomas observados con otros derivados retinoides incluyen dolor abdominal, ataxia, debilidad y dolor de cabeza. La aplicación tópica excesiva puede ocasionar eritema intenso y descamación o molestias locales como ardor y prurito intensos. En caso de ingesta accidental, se presentan síntomas semejantes a la intoxicación de vitamina A: irritabilidad, vómito, anorexia, cefalea, rash, hepatoesplenomegalia e hipertensión intracraneal. El tratamiento se hará con base en medidas generales bajo supervisión médica.

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura no mayor a los 30°C

PRESENTACIONES:

Caja conteniendo un tubo de aluminio de 25g de Retinoico GV crema

Caja conteniendo un tubo de aluminio de 30g de Retinoico GV gel