

Vicroxol-L[®]

GV



DCI: AMBROXOL CLORHIDRATO / LORATADINA

COMPOSICIÓN	JARABE
Ambroxol clorhidrato	30 mg
Loratadina	5 mg
Excipientes c.s.p.	5 mL

FORMA FARMACEUTICA: Jarabe

VIA DE ADMINISTRACION: Oral

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS:

Es la combinación de: Loratadina es un antagonista competitivo de la histamina en los receptores H1 a nivel de las células blanco. Por este mecanismo inhibe los efectos proinflamatorios de la histamina en las vías respiratorias y otros tejidos. Ambroxol estimula la síntesis y secreción del surfactante pulmonar por neumocitos tipo II y células epiteliales; la síntesis de surfactante pulmonar, prostaglandinas y leucotrienos a partir de un precursor común, le confiere un efecto antiinflamatorio indirecto; además, posee efecto barredor de radicales libre de O2 (H2O2, OH, peroxinitrilo).

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS:

Los estudios farmacocinéticos mostraron una rápida absorción de los administrados por vía oral formas de liberación inmediata de clorhidrato de ambroxol, con linealidad en el rango de dosis terapéuticas. La loratadina se absorbe rápidamente en el tracto digestivo después de las dosis orales, las concentraciones plasmáticas máximas se han alcanzado en aproximadamente 1 hora. La biodisponibilidad aumenta y el tiempo para alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas se retrasa cuando se toma con la comida.

INDICACIONES:

Vicroxol-L está indicado para afecciones broncopulmonares alérgicas que cursen con aumento en la viscosidad y adherencia de moco, en los que es necesario mantener libre de secreciones las vías respiratorias, como bronquitis aguda y crónica; útil en rinitis alérgica asociada con traqueítis o estacional asociada con tos no productiva, bronquiectasis, neumonía, sinusitis y otras alergias no respiratorias; asma, urticaria, prurito y neumonía.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

NIÑOS:

De 2 a 5 años con peso > 9 kg: 1.25 mL cada 12 horas.

De 6 a 12 años con peso < 30 kg: 2.5 mL cada 12 horas.

Adultos y mayores de 12 años: 5 mL cada 12 horas.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a componentes de la fórmula, enfermedad ulcerosa gastrointestinal (gastritis, úlcera péptica) y uso concomitante con medicamentos del tipo AINE's.

REACIONES ADVERSAS:

Somnolencia, fatiga, cefalea, reacciones alérgicas, nerviosismo, náuseas, vómito, retención urinaria, dolor epigástrico, hiperacidez gástrica, constipación, erupción cutánea, gastritis y estreñimiento o diarrea, xerostomía, sialorrea y rinorrea, disuria y astenia. En ocasiones se ha detectado alopecia, alteraciones hepáticas, sequedad de vías respiratorias, boca seca y anafilaxia, pero estas reacciones son muy raras.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:

Se debe tener precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave, se debe administrar inicialmente una dosis más baja, ya que estos pacientes pueden tener una depuración más lenta del medicamento. No deberá usarse durante el embarazo. Loratadina se excreta por la leche materna, por lo que no se debe administrar durante la lactancia.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:

La cimetidina, eritromicina y el ketoconazol han demostrado interferir con el metabolismo de la loratadina, probablemente mediante un mecanismo de inhibición de la isoenzima CYP3A4 del citocromo P-450, lo que ocasiona un aumento de las concentraciones plasmáticas de loratadina y de sus metabolitos. La administración de Ambroxol junto con antibióticos (Amoxicilina, Cefuroxima, Eritromicina, Doxiciclina) eleva la concentración de antibiótico en el tejido pulmonar.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Salvo otra recomendación del médico, no se recomienda el uso de este producto en estas etapas.

SOBREDOSIFICACIÓN:

En casos de sobredosis se han reportado: Somnolencia, taquicardia y cefalea. En caso necesario el tratamiento que debe iniciarse inmediatamente es sintomático y coadyuvante. Tratamiento: Debe de tratarse de absorber cualquier cantidad de medicamento que se encuentre en el estómago, administrando carbón activado en forma de suspensión espesa en agua. Se debe de considerar el efectuar lavado gástrico. La solución salina fisiológica es el vehículo de elección para el lavado gástrico, especialmente en niños. En adultos puede usarse agua corriente; sin embargo, antes de la siguiente instilación debe extraerse el mayor volumen posible de líquido administrado previamente.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a los 30°C

PRESENTACIONES:

Caja conteniendo frasco con 60mL

Caja conteniendo frasco de 120mL

Fabricado por:
González & Vicente
Laboratorio, GV. LAB., SRL
Sto. Dgo., República Dominicana
gvlaboratorio.com

