

Minoxidil

Minoxidil USP 2% / 5%

DCI: Minoxidil

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de loción de Minoxidil GV, contiene:

Minoxidil.....	2 g.
Excipientes.....	C.S.p.

Cada 100 mL de loción de Minoxidil GV, contiene:

Minoxidil.....	5 g.
Excipientes.....	C.S.p.

FORMA FARMACÉUTICA: Loción

VIAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópica capilar

INDICACIONES:

Minoxidil GV loción está indicado como coadyuvante en el tratamiento de la alopecia (calvicie) y de la caída del cabello estimulando el crecimiento capilar. Los resultados que se obtienen a través del tratamiento pueden verse después de 3 ó 4 meses de su aplicación.

Minoxidil GV: Se indica en Alopecia areata y en la fragilidad ungueal.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

Presenta baja absorción percutánea; del 1,6 a 3,9% de la dosis tópica total aplicada es absorbida sistémicamente; sin embargo, la absorción puede incrementarse si la medicación es aplicada sobre piel inflamada. El inicio de la acción es por lo menos de 2 meses (aunque en algunos pacientes el efecto toma 4 meses). En la eliminación vía renal, aproximadamente el 95% de lo absorbido sistémicamente, es eliminada dentro de 4 días.

MODO DE APLICACIÓN:

Para aplicar Minoxidil GV, asegúrese que tiene el cuero cabelludo seco y limpio. Aplique en el cuero cabelludo dos veces al día, en la mañana y en la noche, de manera continua por un periodo de 8 semanas como mínimo para empezar a ver los resultados. El efecto en algunos pacientes se ve a los cuatro meses de aplicación. No retire el producto.

CONTRAINDICACIONES:

El riesgo/beneficio debería ser considerado cuando existan los siguientes problemas médicos: Alergia a Minoxidil, enfermedad cardiovascular o hipertensión. Irritación de piel o sarpullido, incluyendo soriasis del cuero cabelludo o quemaduras solares severas (la absorción sistémica puede ser aumentada).

EFFECTOS SECUNDARIOS:

La utilización de este producto puede producir una irritación local y en ciertos casos cefaleas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:

Solo para uso externo. Mantener alejado del fuego o la flama. No usar más cantidad o

frecuencia de la prescrita; no aplicar a otras partes del cuerpo por el riesgo de efectos adversos sistémicos. No usar otros productos sobre la piel tratada como colorantes o permanentes del cabello, se deberá retirar el Minoxidil, lavando el cuero cabelludo, antes del uso; evitar el uso de Minoxidil 24 horas antes y después que sean aplicados otros productos al cabello.

NIÑOS Y ANCIANOS: (no se recomienda), dermatosis o lesión del cuero cabelludo (> absorción percutánea). Recomendable monitorización regular de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, porque aunque no hay absorción sistemática importante, existe la posibilidad de que se produzca una pequeña absorción local. Problema cardíaco o cardiovascular como: coronariopatías, insuficiencia cardíaca congestiva y/o valvulopatías, riesgo potencial de retención hidrosalina, edema local y generalizado, efusión pericárdica, pericarditis, taponamiento cardíaco, taquicardia, angina. Suspender si aparecieran efectos sistémicos o alteraciones dermatológicas severas. Evitar: contacto con ojos, en piel abrasiva y mucosas. Embarazo y lactancia: No se recomienda

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:

Las combinaciones conteniendo cualquiera de los siguientes medicamentos, dependiendo de la cantidad presente, también pueden interactuar con esta medicación: Corticosteroides tópicos, Petrolato tópico y retinoides tópicos: su uso concurrente en la misma área puede elevar la absorción cutánea de Minoxidil por el incremento de la permeabilidad del estrato córneo, y por eso no se recomienda. Guanetidina: su uso concurrente puede incrementar la probabilidad de hipotensión ortostática.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE INTOXICACIÓN:

En caso de contacto accidental con los ojos u otras mucosas sensibles, lavar con abundante agua fresca. En caso de ingesta accidental, sólo se deben realizar medidas generales de soporte. Para evitar la aspiración, no debe realizarse lavado gástrico ni provocar el vómito. Si se presentase una reacción de hipersensibilidad, deberá suspenderse la aplicación del producto y tratarla con los medicamentos adecuados. Tratamiento de sobredosis: Si ocurre toxicidad sistémica como resultado de sobredosis por ingestión oral de Minoxidil tópico, el tratamiento puede incluir hemodiálisis, Minoxidil y sus metabolitos son hemodializables.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO:

La hipotensión puede ser tratada con fenilefrina, angiotensina II, vasopresina o dopamina. Medicaciones simpaticomiméticas, similares a norepinefrina o epinefrina se deberá evitar por el riesgo de excesiva estimulación cardíaca. Cuidados de soporte: La administración de cloruro de sodio intravenoso es recomendado para mantener la presión sanguínea.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a los 30°C

PRESENTACIONES:

Caja con frasco gotero de vidrio ámbar conteniendo 100 mL de Minoxidil GV 2%

Caja con frasco gotero de vidrio ámbar conteniendo 100 mL de Minoxidil GV 5%

Fabricado por:
González & Vicente
Laboratorio, GV. LAB., SRL
Sto. Dgo., República Dominicana
gvlaboratorio.com

