

Momevic[®]

Furoato de
Mometasona **0.1%**

DCI: Furoato de mometasona

COMPOSICIÓN:

Cada 100mL contiene:

Furoato de mometasona.....0.1%
Excipientes c.s.p..... 100.0 mL

Cada 100g contiene:

Furoato de mometasona.....0.1g
Excipientes c.s.p..... 100.0 g

FORMA FARMACÉUTICA: Loción, crema

VÍAS DE ADMINISTRACION: Tópico

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

Propiedades: Propiedades farmacodinamias: Los corticoides poseen propiedades anti-inflamatorias, anti-pruriginosas y vasoconstrictoras. En las alergias, los corticosteroides reducen las respuestas alérgicas de varios tipos de células (p.ej. mastocitos y eosinófilos) implicadas en las respuestas alérgicas. A nivel molecular, los corticosteroides circulantes en la sangre cruzan fácilmente las membranas celulares y se unen, con gran afinidad, a receptores citoplasmáticos específicos. Propiedades farmacocinéticas: La absorción percutánea del Furoato de mometasona tiene variaciones individuales y puede aumentar por el uso de vendajes oclusivos y cuando hay procesos inflamatorios o enfermedades de la piel. Aproximadamente 5% de la dosis aplicada tópicamente fue sistémicamente absorbida siguiendo a la aplicación tópica de la crema y 6% siguiendo a la aplicación tópica de la formulación del ungüento

INDICACIONES:

MOMEVIC es un corticosteroide tópico de mediana potencia que está indicado para el tratamiento de manifestaciones inflamatorias y pruríticas de las dermatosis, tales como Psoriasis, Dermatitis atópicas, Dermatitis alérgicas y/o por contacto.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Loción: Dosis en adultos: directamente sobre el cuero cabelludo, una vez al día.
Crema: Aplicar una pequeña cantidad en el área afectada hasta cubrir la misma, una o dos veces al día. Si no se observa mejoría dentro de dos semana consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en aquellos pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a los componentes de la fórmula del producto.

REACIONES ADVERSAS: La mayor frecuencia de reacciones adversas a la mometasona tópica se debe a erupciones acneiformes, foliculitis, forunculosis, atrofia de la piel, irritación de la piel (ardor, escozor, hormigueo prurito).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO:

Únicamente para uso externo. Mantener alejado de los ojos. No usar apósitos a menos que el médico tratante lo indique. No usar en la cara, región inguinal o axila a menos que el médico tratante lo indique. Si pierde una dosis, aplíquela tan pronto como sea posible, a menos que esté cerca de la siguiente dosis.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS:

No se conocen interacciones clínicamente significativas de MOMEVIC loción con otros fármacos.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

No hay estudios adecuados y bien controlados de los efectos teratogénicos en la mujer embarazada. Por lo tanto, los corticosteroides tópicos deberían ser usados durante el embarazo solamente si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto. No se sabe si la administración tópica de corticosteroides podría producir suficiente absorción sistémica para producir cantidades detectables en la leche materna.

SOBREDOSIFICACIÓN:

Para mayor información sobre el manejo de la sobredosis o ingestión no intencional, contacte el Centro de Control de Envenenamientos. Tratamiento de la sobredosis: Para la sobredosis tópica crónica: Debido a que no existe un antídoto específico, el tratamiento es sintomático, de soporte, y consiste en discontinuar el tratamiento de corticosteroides tópicos. Puede ser necesario un retiro gradual de la preparación.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a los 30°C

PRESENTACIONES:

Caja conteniendo un frasco de 30mL de Momevic loción tópica
Caja con tubo de Aluminio conteniendo 20 g. de MOMEVIC crema.