

Peróxido de Benzoilo

Peróxido de Benzoilo 5%

DCI: Peróxido de Benzoilo

COMPOSICIÓN:

Cada 100 gramos contiene:

Peróxido de benzoilo.....	5.0 g
Excipientes C.S.P.....	100.0 g

FORMA FARMACÉUTICA: Gel

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

INDICACIONES:

El peróxido de benzoilo GV gel es uno de los tratamientos usados para el acné leve o moderado.

ACCION FARMACOLOGICA:

El peróxido de benzoilo es un peróxido con actividad antibacteriana, irritante, queratolítica, comedolítica y antiinflamatoria. Tras la aplicación tópica, el peróxido de benzoilo se descompone para liberar oxígeno que es letal para la bacteria *Propionibacterium acnes*.

POSOLOGIA:

Peróxido de benzolilo GV debe aplicarse 1 ó 2 veces por día para cubrir las superficies afectadas después de lavarlas con un limpiador suave y agua, o según indicación del médico

CONTRAINDICACIONES:

Están contraindicados en pacientes con historial de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.

REACCIONES ADVERSA:

Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas): sequedad de la piel, descamación de la piel, sensación de quemazón en la piel, enrojecimiento de la piel (eritema).

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): irritación de la piel (dermatitis irritativa de contacto), dolor en

la piel, picor en la piel (prurito). Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas): dermatitis alérgica de contacto, hinchazón de la cara, reacciones alérgicas incluyendo hipersensibilidad en el lugar de aplicación y anafilaxia, reacción de fotosensibilidad

INTERACCIÓN: Comunique a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento. No utilice otros productos queratolíticos o para el acné (que contengan peróxido de benzoilo, salicilatos o azufre) al mismo tiempo que Peróxido de Benzoilo GV gel, podrían aumentar la aparición de irritación de la piel.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Puede producir irritación local, en los primeros días con enrojecimiento y sensación de quemazón leve, por lo que se recomienda su aplicación gradual comenzando por las concentraciones más bajas. Y variar la concentración o frecuencia según la respuesta particular de cada paciente.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a los 30°C

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo un tubo con 30g.