

Triblanq

Crema blanqueadora

TRIBLANQ GV.

DCI: Tretinoína, Hidroquinona, Hidrocortisona

COMPOSICION:

Cada gramo de TRIBLANQ GV crema contiene:

Tretinoína.....	0.00025 g.
Hidroquinona.....	0.050 g.
Hidrocortisona.....	0.005 g.
Excipiente c.s.p.....	1g.

FORMA FARMACÉUTICA: Crema.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

INDICACIONES:

TRIBLANQ GV crema está indicada para el tratamiento del melasma moderado a severo. Dicho tratamiento tiene que ser aplicado en forma conjunta con medidas para evitar el sol, incluyendo el uso de protectores solares.

POSOLOGÍA:

TRIBLANQ GV crema debe aplicarse una vez al día por la noche, por lo menos 30 minutos antes de acostarse.

Lave el rostro y el cuello con un dermolimpiador suave. Enjuague abundantemente y seque la piel. Aplique una delgada película del producto en las áreas hiperpigmentadas incluyendo aproximadamente $\frac{1}{2}$ cm de piel normal alrededor de cada lesión. Frote suave y uniformemente la zona de aplicación.

CONTRAINDICACIONES:

TRIBLANQ GV crema está contraindicado en individuos con historia de hipersensibilidad, alergia o intolerancia a este producto o a alguno de sus componentes.

REACCIONES ADVERSAS:

TRIBLANQ GV Crema contiene hidroquinona y tretinoína, las cuales pueden causar una irritación leve a moderada. En el lugar de aplicación se puede producir irritación local como enrojecimiento, peeling, leve sensación de ardor, sequedad y prurito. Un enrojecimiento transitorio o una sensación leve de ardor no es motivo para interrumpir el tratamiento. Si una reacción sugiere hipersensibilidad o irritación química, el uso de la medicación deberá ser espaciado a una aplicación inter diaria hasta que la piel se adapte a los fármacos y de continuar se debe suspender el tratamiento.

Los eventos reportados con mayor frecuencia fueron: eritema, descamación, ardor, sequedad y prurito en el sitio de aplicación, la mayoría fueron de leves a moderados en lo que respecta a su severidad.

TRIBLANQ GV crema contiene hidroquinona, la cual puede producir ocronosis exógena, un oscurecimiento gradual de color azul negruzco en la piel, si ésta aparece deberá discontinuarse inmediatamente la terapia. La mayoría de los pacientes que desarrollaron esta condición son de raza negra, pero también puede ocurrir en pacientes caucásicos e hispanos.

INTERACCIONES:

Los pacientes en tratamiento con TRIBLANQ GV crema deben evitar el uso de jabones y limpiadores medicinales abrasivos, jabones y cosméticos con efecto secante, productos con alta concentración de alcohol y/o astringentes, otros irritantes o queratolíticos.

Debe evitarse o valorarse cuidadosamente el uso concomitante con queratolíticos, especialmente sulfuros, resorcinol, peróxido de benzoilo o ácido salicílico, así como jabones abrasivos, secantes o cosméticos medicados. La aplicación de fórmulas con elevadas cantidades de alcohol, mentol, especias o extractos cítricos, así como lociones astringentes, cremas de afeitar y perfumes, deben evitarse puesto que pueden aumentar el riesgo de urticarias.

Pacientes que han estado con un tratamiento con base en queratolíticos previamente, debe darse un plazo para que desaparezcan los efectos de ellos y poder iniciar un tratamiento con ácido retinoico.

PRECAUCIONES:

Cuando se está utilizando TRIBLANQ GV crema es necesario que los pacientes eviten la exposición a la luz solar, utilicen protectores solares con un factor de protección solar apropiado, vestimenta protectora, y que no usen métodos anticonceptivos hormonales. No use vendajes oclusivos. Los pacientes pueden usar humectantes y/o cosméticos durante el día.

Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Evite la exposición directa del rostro al sol. No indicado para uso oftálmico. Evite el contacto con los ojos, labios, mucosas y heridas.

TRIBLANQ GV crema es un producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante el período de lactancia a menos que el médico lo indique.

CONSERVACIÓN:

Consérvese a temperatura menor de 30°C antes de quitar el sello de protección y después de abrir mantener de 2 a 8°C

PRESENTACIÓN:

Caja con tubo de Aluminio conteniendo 25 g. de TRIBLANQ GV crema.

Producido en la República Dominicana por
González & Vicente Laboratorio SRL

Fabricado por:
González & Vicente
Laboratorio, GV. LAB., SRL
Sto. Dgo., República Dominicana
gvlaboratorio.com

