

Eritromicina

Eritromicina 4% 

DCI: Eritromicina base

COMPOSICIÓN:

Cada 100mL de Loción contiene:

Eritromicina base.....	4.0 g
Excipientes c.s.p.....	100mL

Cada 100g de Gel contiene:

Eritromicina base.....	4.0 g
Excipientes c.s.p.....	100g

FORMA FARMACÉUTICA: Loción, Gel

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

Propiedades: Propiedades farmacodinamias: La eritromicina se une a la subunidad 50S del ribosoma bacteriano inhibiendo la síntesis de proteínas. Es efectiva frente a un amplio espectro de microorganismos y, al igual que otros antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, la eritromicina es bacteriostática. Su actividad frente a gérmenes gram-positivos es mayor que frente a los gram-negativos, debido a su mejor penetración en los primeros. Propiedades farmacocinéticas: La biodisponibilidad de la eritromicina no es buena. La eritromicina se inactiva fácilmente en el medio ácido del estómago por lo que se han desarrollado varios derivados. La absorción tiene lugar sobre todo en el duodeno, dependiendo la biodisponibilidad del tiempo de vaciado gástrico, del derivado de eritromicina administrado y de la presencia de alimento en el duodeno.

INDICACIONES:

Eritromicina GV está indicado en el tratamiento tópico del acné vulgaris con predominio de pápulas y pústulas.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Debe aplicarse una delgada película de Eritromicina GV sobre las áreas afectadas previamente higienizadas, por la mañana y por la noche. En pieles sensibles puede comenzar con una sola aplicación al día. Por lo general, será necesario un periodo de tratamiento de 8 semanas, pero en caso de recidiva el periodo de tratamiento puede prolongarse. Después de la aplicación se debe lavar las manos para evitar el contacto accidental con los ojos.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de la formula.

REACIONES ADVERSAS: Las reacciones adversas registradas con tratamiento tópico a base de eritromicina incluyen: sequedad, sensibilidad, prurito, descamación, eritema, aspecto seborreico y sensación de ardor, las cuales son reversibles cuando se suspende el tratamiento o cuando se reduce la frecuencia de la administración.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO: ERITROMICINA GV está indicado exclusivamente para uso externo, debiendo evitarse el contacto con las mucosa ocular, nasal y bucal. Si se aplica en forma excesiva no se obtendrán resultados más rápidos ni mejores y puede producirse una marcada irritación o descamación. No se ha establecido la inocuidad de uso durante el embarazo ni en el periodo de lactancia. Sin embargo, el uso del producto deberá ser valorado por el medico de acuerdo con el beneficio. No existen datos reportados a la fecha en relación con efectos de carcinogénesis, mutagenesis, teratogénesis y sobre la fertilidad.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS: Aunque no ha sido demostrado interacción alguna, la posibilidad de un efecto irritante exige cautela al utilizar junto a ERITROMICINA GV otros medicamentos tópicos para el acné, particularmente los agentes abrasivos o queratolíticos, ya que se puede producir un efecto irritante acumulativo.

EMBARAZO Y LACTANCIA: No se ha establecido la seguridad de su empleo en estas condiciones durante el embarazo ni el periodo de lactancia. Su uso en embarazo debería ser bajo supervisión médica. La eritromicina se clasifica dentro de la categoría B de riesgo en el embarazo. Los datos disponibles evidencian que la eritromicina no es teratogénica ni tiene efectos adversos sobre el embarazo.

SOBREDOSIFICACIÓN: Si llegara a presentarse una reacción de hipersensibilidad, deberá suspenderse la utilización del producto y tratarla si es necesario con algún emoliente.

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura no mayor a los 30°C

PRESENTACIONES:

Caja conteniendo frasco gotero de 30mL de Eritromicina GV Loción tópica
Caja conteniendo tubo de 30g de Eritromicina GV Gel.

Fabricado por:
González & Vicente
Laboratorio, GV. LAB., SRL
Sto. Dgo., República Dominicana
gvlaboratorio.com

